QUADRIFINA Band 3 39-46 31. Mai 2000

Die neotropischen Noctuidae-Typen Zerny's (Lepidoptera: Noctuidae)

H. Thöny

Abstract

The twenty Noctuidae-species from the Neotropical Region described by Dr. Hans Zerny (ZERNY 1916) are cited and illustrated. The species are kept in the collections of the Museum of Natural History in Vienna (NHMW).

Zusammenfassung

Die zwanzig neotropischen Noctuidae-Arten, die Dr. Hans Zerny (ZERNY 1916) beschrieb, werden zitiert und abgebildet. Alle Taxa werden im Naturhistorischen Museum Wien (NHMW) aufbewahrt.

Key words: Neotropical Region, Noctuidae, types, Zerny.

Einleitung

Während eines Aufenthaltes in Wien, im Herbst 1998, war es mir möglich die neotropischen Typen, die ZERNY (1916) beschrieb, im Naturhistorischen Museum in Wien (NHMW) zu fotografieren. Die Gattungszuordnung richtet sich nach POOLE, 1989.

Bei einigen Arten läßt allerdings schon der erste Blick vermuten, daß diese nicht immer richtig ist. Da es mir aber in erster Linie darum geht, die Typen abzubilden, um sie so einer breiten Leserschaft zugänglich zu machen, wird auf eine genauere Zuordnung verzichtet. Dies wird weiterführenden Arbeiten vorbehalten bleiben.

Insgesamt beschrieb ZERNY (1916) zwanzig neue, neotropische Taxa, ohne allerdings eindeutige Holotypen festzulegen. Deshalb verzeichnet POOLE (1989) bei vielen Arten Syntypen. Von den zwanzig Taxa sind mittlerweile zwei als Synonyme erkannt worden.




Abb. 1-7:

Zerny-Typen neotropischer Noctuidae im NHMW.

Amphipyrinae

Trachea stieglmayri ZERNY, 1916 (Abb. 1)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 183, Taf. 5: 3.
Syntypen: 2 ♂♂, Brasilien, Rio Grande do Sul. (NHMW).

Hampsonodes atrosignata (ZERNY, 1916) [*Calymniodes*] (Abb. 2)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 187, Taf. 5: 17.
Holotypus: ♂, Bolivia, Rio Songo (NHMW).

Callopistria (*Callopistria*) *plinthobaps* (ZERNY, 1916) [*Eriopus*] (Abb. 3)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 184, Taf. 5: 18.
Syntypen: 2 ♂♂, Bolivia, Rio-Songo (NHMW).

Hadeninae

Polia (*Polia*) *tolimae tolimae* (ZERNY, 1916) [*Mamestra*] (Abb. 4)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 176, Taf. 5: 26.
Holotypus: ♀, Columbia, Mte. Tolima (NHMW).

Pastona separata (ZERNY, 1916) [*Leucosigma*] (Abb. 5)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 186, Taf. 5: 15.
Holotypus: ♂, Bolivien, Küste v. Cillitincara (NHMW).

Dargida jucundissima (ZERNY, 1916) [*Dryobota*] (Abb. 6)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 181, Taf. 5: 25.
Holotypus: ♂, Brasilien, Sao Paulo, Ypanema (NHMW).

Hyssia melanopis DRUCE, 1908 (Abb. 7)

Ann. Mag. Nat. Hist. 1(8): 293.
Type(n): ♂, Peru, Oconeque, Carabaya (BMNH, London).
=*Eriopyga cillutincarae* ZERNY, 1916.
Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 180, Taf. 5: 7
Holotypus: ♀, Bolivien, Küste v. Cillutincara (NHMW).




Abb. 8-14:

Zerny-Typen neotropischer Noctuidae im NHMW.

Nephelistis orbicularis ZERNY, 1916 (Abb. 8)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 177
Syntypen: 2 ♂♂, Bolivien, Küste v Cillutincara (NHMW).

Eriopyga augur ZERNY, 1916 (Abb. 9)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 179, Taf. 5: 2
Holotypus: ♀, Bolivien, Küste v. Cillutincara (NHMW).

Eriopyga magnifica ZERNY, 1916 (Abb. 10)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 178, Taf. 5: 12
Syntypen: 1 ♂, 3 ♀♀, Bolivien, Küste v. Cillutincara (NHMW).

Eriopyga remipes ZERNY, 1916 (Abb. 11)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 178, Taf. 5: 19
Holotypus: ♂, Bolivien, Rio Songo (NHMW).

Noctuinae

Agrotis (Agrotis) lilacina ZERNY, 1916 (Abb. 12)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 174, Taf. 5: 23
Holotypus: Bolivien, Küste v. Cillutincara (NHMW).

Praina leucaniiformis (ZERNY, 1916) [*Agrotis*] (Abb. 13)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien. 30: 173.
Syntypen: 3 ♂♂, Bolivien, Küste v. Cillutincara (NHMW).

Apoxestia ioglauca (ZERNY, 1916) [*Agrotis*] (Abb. 14)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien. 30: 175, Taf. 5: 23.
Holotypus: ♀, Bolivien, Küste v. Cillutincara (NHMW).

Acontiinae

Acontia fiebrigi (ZERNY, 1916) [*Tarache*] (Abb. 15)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 189, Taf. 5: 13.
Holotypus: Paraguay, Chaco (NHMW).




Abb. 15-20:

Zerny-Typen neotropischer Noctuidae im NHMW.

Euteliinae

Paectes songoensis ZERNY, 1916 (Abb. 16)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien. 30: 189, Taf. 5: 11
Holotypus: ♂, Bolivia, Rio Songo (NHMW).

Catocalinae

Acanthodica fassli ZERNY, 1916 (Abb. 17)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 192, Taf. 5: 5
Syntypen: 2 ♀♀, Bolivien, Rio Songo (NHMW).

Dysgonia iotrigona (ZERNY, 1916) [*Parallelia*] (Abb. 18)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 194, Taf. 5: 9.
Syntypen: 2 ♂♂, 1 ♀, Bolivia, Rio Songo (NHMW).

Concana lecta SCHAUS, 1911 (Abb. 19)

Ann. Mag. Nat. Hist. 8(8): 214
Type(n): Costa Rica, Avangarez, Juan Vinas (USNM, Washington)
= ***lophophora*** **(ZERNY, 1916)** [*Chytonyx*].
Ann. Nat. Hist Mus. Wien. 30: 185, Taf. 5: 6.
Syntypen: 2 ♂♂, Bolivia, Rio Songo (NHMW).

Diopa nigrofasciata (ZERNY, 1916) [*Speocropia*] (Abb. 20)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien, 30: 183, Taf. 5: 10.
Syntypen: 2 ♂♂, Bolivien, Rio Songo (NHMW).

Danksagung

An dieser Stelle sei Herrn Mag.Dr. Martin Lödl recht herzlich für die Hilfe bei meinem Besuch im NHMW, Wien gedankt.

Literatur

DRUCE, H. 1908: Descriptions of some new Species of Noctuidae from Peru. - The Annals and Magazine of Natural History, 1(8): 289-303.

POOLE, R.W. 1998: Lepidopterum Catalogus (new series) Fasc. 118, Noctuidae Pt. 1-3.-E. J. Brill, Fauna & Flora Publ., Leiden, New York, 1314pp.

SCHAUS, W. 1911: New Species of Heterocera from Costa Rica.-X. – The Annals and Magazine of Natural History, 8(8): 208-231.

ZERNY, H. 1916: Neu Heteroceren aus der Sammlung des k.k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien. II. - Annalen des k.k. Naturhistorischen Hofmuseums, 30: 173-195, 1 Tafel.

Verfasser: Hubert Thöny, Rua Sebastiao Pena 118 A, Cep. 39827 Potè, MG, Brasilien Tel. & Fax: 0055335251304, E-Mail: hubert.thony@mailbr.com.br

---